



Vademécum



Catálogo de Especialidades Farmacéuticas Veterinarias



 **Lisanit**[®]
calidad humana para sus mascotas

Índice por áreas terapéuticas

CATEGORÍA TERAPÉUTICA	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	Nº de página
1. ANTIFÚNGICOS	Clotrimazol BN®	Tubo x 35 g	4
	Fluconazol	Caja x 10 tabletas de 200 mg	5
	Ketoconazol tabletas	Caja x 10 tabletas de 200 mg	6
2. ANTIBIÓTICOS Y ANTIMICROBIANOS	Ciprofloxacina 50 mg	Caja x 10 tabletas de 50 mg	7
	Ciprofloxacina 250 mg	Caja x 10 tabletas de 250 mg	8
	Doxiclin-Lisan®	Caja x 60 tabletas de 300 mg	9
	Metronidazol suspensión	Frasco x 60 mL (125 mg / 5 mL) Suspensión oral	10
	Metronidazol Lisan	Caja x 20 tabletas de 500 mg	11
	Trimetoprima Sulfa	Frasco x 60 mL Suspensión oral	12
	Trimetoprima Sulfa tabletas	Caja x 10 tabletas de 450 mg	13
3. ANTIPARASITARIOS INTERNOS	Ovistop® tabletas 2 kg	Caja x 45 blíster x 2 tabletas	14
	Ovistop® tabletas 5 kg	Caja x 40 blíster x 2 tabletas	15
	Ovistop® tabletas 15 kg	Caja x 30 blíster x 2 tabletas	16
	Ovistop® tabletas 40 kg	Caja x 12 blíster x 2 tabletas	17
	Ovistop® suspensión	Frasco x 15 mL Suspensión oral	18
4. ANALGÉSICOS, ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIALÉRGICOS	Fenilbutazona	Tubo x 90 g	19
	Prednisolona	Frasco x 30 mL (15 mg/ 5 mL) Solución oral	20
	Tramadol	Frasco x 10 mL (100 mg/mL) Solución oral	21

Índice por áreas terapéuticas

CATEGORÍA TERAPÉUTICA	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	Nº de página
5. ANSIOLÍTICO NATURAL	Quiettuspet®	Caja x 15 blíster x 4 tabletas	22
6. CICATRIZANTE NATURAL	Cicatrizante Natural Aceite Árbol de té + Aloe Vera	Tubo x 35 g	23
7. GASTROENTEROLÓGICOS	Lope Lisan®	Frasco x 100 mL Suspensión oral	24
	Metoclopramida	Frasco gotero x 30 mL (4,6 mg/mL) Solución oral	25
	Ranitidina	Frasco x 60 mL (150 mg/5 mL) Solución oral	26
8. MINERALES Y VITAMINAS	Calcio con Fósforo y Vitaminas B ₁₂ y D ₃	Frasco x 173 mL Suspensión oral	27
9. RESPIRATORIO	Bromhexina	Frasco x 60 mL y 120 mL (4 mg/mL) Solución oral	28
10. SHAMPOO MEDICADO	Shampoo Gluconato de Clorhexidina 3%	Frasco x 220 mL, litro y galón	29
11. SHAMPOOS COSMÉTICOS	Shampoo con Aloe Vera	Frasco x 245 mL	30
	Shampoo de Azufre y Arcilla	Frasco x 245 mL	31
	Shampoo con Azul de Metileno	Frasco x 245 mL	32
12. ANTISÉPTICOS	Sterovet® 4%	Frasco x 1 litro	33
INFO DE LISAN			34
INFO DE CONTACTO			35

1. ANTIFÚNGICOS

CLOTRIMAZOL BN®

Descripción:

Fungicida, bactericida, antiinflamatorio en crema.

Fórmula:

Cada gramo contiene

Clotrimazol..... 10 mg

Sulfato de Neomicina..... 5 mg

Betametasona (Dipropionato)..... 0.5 mg

Indicaciones:

Afecciones cutáneas o procesos alérgicos causados por hongos o bacterias, en bovinos, caprinos, porcinos, aves, equinos, perros y gatos.

Administración / Dosis:

Aplicar una delgada capa de la crema sobre el área afectada 2 veces al día, favoreciendo la absorción mediante la fricción (masaje circular). Continuar el tratamiento varios días después de haber desaparecido signos como prurito e inflamación, o según indicación del Médico Veterinario.

Contraindicaciones y advertencias:

No utilizar en animales con hipersensibilidad demostrada a cualquiera de los componentes.

Vía de administración: Uso tópico

Presentación: Tubo x 35 g

**PRODUCTO**

Clotrimazol BN®

N° DE REGISTRO

MV-6024

CÓDIGO DE BARRAS

1. ANTIFÚNGICOS

FLUCONAZOL

Descripción:

Antimicótico en tabletas.

Fórmula:

Cada tableta ranurada contiene:
Fluconazol 200 mg

Indicaciones:

Antimicótico de amplio espectro para el tratamiento de enfermedades fúngicas que afectan a perros y gatos, tales como Dermatitis por *Malassezia*, Dermatomicosis, Criptococosis, Candidiasis, etc.

Administración / dosis:

Perros y gatos

Malassezia: De 5 - 10 mg por kg (1/2 a 1 tableta por cada 20 kilos de peso), cada 24 horas por 4 a 8 semanas. Puede considerarse la administración una vez por semana de acuerdo a la severidad de las lesiones.

Candidiasis, Criptococosis y Micosis sistémica: administrar de 2.5 - 5 mg por kg cada 24 horas durante 60-80 días.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a los azoles. No utilizar en animales preñados.

Precauciones y advertencias:

Usar con cautela durante la lactancia y en pacientes con deterioro de la función hepática.

Vía de administración: Uso Oral

Presentación: Caja x 10 tabletas ranuradas

**PRODUCTO**

Fluconazol

N° DE REGISTRO

MV-6025

CÓDIGO DE BARRAS

1. ANTIFÚNGICOS

KETOCONAZOL TABLETAS

Descripción:

Antimicótico en tabletas.

Fórmula:

Cada tableta ranurada contiene:
Ketoconazol..... 200 mg

Indicaciones:

Infecciones de la piel que no responden a terapia local como: Dermatomicosis, candidiasis mucocutáneas, blastomicosis, coccidiomicosis, *Malassezia pachydermatis*, histoplasmosis, criptococosis y aspergilosis sistémica.

Administración / Dosis:

Perros: 5 - 20 mg por kg 1 vez al día. De 1 a 8 semanas en dermatofitos.

Gatos: 5 - 10 mg por kg 1 vez al día.

Se recomiendan tratamientos durante un lapso de 8 a 15 días, o según criterio del Médico Veterinario.

En micosis sistémicas se puede ampliar el tratamiento hasta por 3 meses.

Contraindicaciones:

Pacientes con hipersensibilidad conocida a la fórmula.

Precauciones y Advertencias:

Utilizar con mucha precaución en hembras gestantes y en animales con enfermedad hepática.

Vía de administración: Uso Oral

Presentación: Caja x 10 tabletas ranuradas

**PRODUCTO**

Ketoconazol tabletas

N° DE REGISTRO

MV-1114

CÓDIGO DE BARRAS

2. ANTIBIÓTICOS Y ANTIMICROBIANOS

CIPROFLOXACINA 50 mg

Descripción:

Antibiótico en tabletas.

Fórmula:

Cada tableta contiene:

Ciprofloxacina base..... 50 mg

Indicaciones:

Infecciones respiratorias, óticas, nasales, oculares, gastrointestinales, urogenitales, osteoarticulares causadas por gérmenes susceptibles a la fórmula.

Administración / Dosis:

Perros y gatos: 5 - 15 mg por kg de peso (equivalente a 1 tableta por cada 5 kilos de peso), cada 12 horas durante un lapso de 5 a 7 días mínimo.

Para infecciones del tracto urinario y dermatitis superficiales:

Se recomienda 10 mg por kg cada 24 horas.

El protocolo de tratamiento puede variar según criterio del Médico Veterinario.

Contraindicaciones:

No administrar a hembras gestantes, lactantes, ni a perros o gatos menores de ocho meses.

Precauciones y Advertencias:

Pacientes con deterioro de la función renal o hepática pueden requerir ajuste de la dosis. No permitir que el paciente se deshidrate durante el tratamiento.

Vía de administración: Uso Oral

Presentación: Caja x 10 tabletas

**PRODUCTO**

Ciprofloxacina 50 mg

N° DE REGISTRO

MV-1763

CÓDIGO DE BARRAS

2. ANTIBIÓTICOS Y ANTIMICROBIANOS

CIPROFLOXACINA 250 mg

Descripción:

Antibiótico en tabletas.

Fórmula:

Cada tableta ranurada contiene:
Ciprofloxacina base..... 250 mg

Indicaciones:

Infecciones respiratorias, óticas, nasales, oculares, gastrointestinales, reproductivas, óseas, articulares causadas por gérmenes susceptibles a la fórmula.

Administración / Dosis:

Perros y gatos: 5 - 15 mg por kg de peso (equivalente a 1 tableta por cada 25 kg de peso), cada 12 horas durante un lapso de 5 a 7 días mínimo.

Para infecciones del tracto urinario y dermatitis superficiales:

Se recomienda 10 mg por kg cada 24 horas.
El protocolo de tratamiento puede variar según criterio del Médico Veterinario.

Contraindicaciones:

No administrar a hembras gestantes, lactantes ni a perros o gatos menores de ocho meses.

Precauciones y Advertencias:

Pacientes con deterioro de la función renal o hepática pueden requerir ajuste de la dosis. No permitir que el paciente se deshidrate durante el tratamiento.

Vía de administración: Uso Oral

Presentación: Caja x 10 tabletas ranuradas

**PRODUCTO**

Ciprofloxacina 250 mg

N° DE REGISTRO

MV-1762

CÓDIGO DE BARRAS

2. ANTIBIÓTICOS Y ANTIMICROBIANOS

DOXICLIN-LISAN®

Descripción:

Antibiótico de amplio espectro en tabletas.

Fórmula:

Cada tableta ranurada contiene:
Doxiciclina base (Hiclato)..... 300 mg

Indicaciones:

Tratamiento de enfermedades del sistema respiratorio, urogenital y en casos de colangitis, mastitis, prostatitis y piodermatitis causadas por agentes susceptibles a la Doxiciclina. Es la droga de elección para el tratamiento contra *Ehrlichia canis*.

Administración / Dosis:**Perros:**

Ehrlichiosis: 10 mg por kg (1 tableta por 30 kg de peso) cada 12 horas por un período de 22 a 28 días o según criterio del Médico Veterinario.

Infecciones susceptibles: 5 mg por kg cada 12 horas o la que el Médico Veterinario indique.

Contraindicaciones:

No utilizar en pacientes con enfermedad hepática severa.

No administrar a hembras gestantes.

No administrar en animales menores de 8 semanas.

Precauciones y Advertencias:

Administrar junto con alimento para reducir la posibilidad de gastritis.

Vía de administración: Uso Oral**Presentación:**

Caja x 60 tabletas ranuradas

**PRODUCTO**

Doxiclin-Lisan®

N° DE REGISTRO

MV-4616

CÓDIGO DE BARRAS

2. ANTIBIÓTICOS Y ANTIMICROBIANOS

METRONIDAZOL SUSPENSIÓN

Descripción:

Antiparasitario - Bactericida en suspensión oral

Fórmula:

Cada 5 mL (1 cucharadita) contiene:
Metronidazol (en forma de Benzoato) 125 mg

Indicaciones:

Indicado para el control y tratamiento de las infecciones producidas por *Giardia*, *Trichomonas* en perros y gatos, así como infecciones anaeróbicas entéricas y sistémicas.

También por su acción inhibitoria sobre la inmunidad mediada por células, se utiliza como tratamiento coadyuvante de la enteritis plasmocítica linfocítica.

Administración / Dosis:

Perros y gatos: en Giardiasis, administrar 1 mL por kg de peso dos veces al día durante un lapso de 7 a 8 días, lo que equivale a 25 mg por kilo de peso 2 veces al día. La dosis y duración del tratamiento puede variar según criterio del Médico Veterinario.

Contraindicaciones:

No se debe administrar en hembras en estado de gestación o durante el período de lactancia, ni en casos de hipersensibilidad a la fórmula.

Precauciones y Advertencias:

Utilizar con prudencia en pacientes con disfunción hepática.

Vía de administración: Uso Oral

Presentación: Frasco x 60 mL



PRODUCTO

Metronidazol
Suspensión

N° DE REGISTRO

MV-4777

CÓDIGO DE BARRAS



2. ANTIBIÓTICOS Y ANTIMICROBIANOS

METRONIDAZOL LISAN

Descripción:

Antiparasitario - Bactericida en tabletas.

Fórmula:

Cada tableta ranurada contiene:
Metronidazol..... 500 mg

Indicaciones:

Indicado para el control y tratamiento de las infecciones producidas por *Giardia*, *Trichomonas* en perros y gatos, así como infecciones anaeróbicas entéricas y sistémicas.

También por su acción inhibitoria sobre la inmunidad mediada por células, se utiliza como tratamiento coadyuvante de la enteritis plasmocítica linfocítica.

Administración / Dosis:

Perros y gatos: 25 mg por kg cada 12 horas durante 8 días (equivalente a una dosis diaria de 50 mg por Kg). El protocolo de tratamiento puede variar según el criterio del médico veterinario.

Guía Práctica:

PESO/KG	#TABLETAS	Cada 12 horas
5	1/4	
10	1/2	
15	3/4	
20	1	

Contraindicaciones:

No se debe administrar en hembras en estado de gestación o durante el periodo de lactancia, ni en casos de hipersensibilidad a la fórmula.

Precauciones y Advertencias:

Administrar con precaución en pacientes con disfunción hepática.

Vía de administración: Uso Oral

Presentación:

Caja x 20 tabletas
ranuradas recubiertas



PRODUCTO

Metronidazol Lisan

N° DE REGISTRO

MV-5031

CÓDIGO DE BARRAS



2. ANTIBIÓTICOS Y ANTIMICROBIANOS

TRIMETOPRIMA SULFA

Descripción:

Antibiótico en suspensión oral.

Fórmula:

Cada 5 mL (1 cucharadita) contiene:

Trimetoprima 40 mg

Sulfametoxazol 200 mg

Indicaciones:

Infecciones de vías respiratorias, tracto urinario, gastrointestinal, piel y enteritis por coccidias.

Administración / Dosis:

Perros y gatos: 1 mL por cada 2 kg de peso cada 12 horas por 5 días.

Contraindicaciones:

No utilizar en pacientes hipersensibles a las sulfonamidas.

Precauciones y Advertencias:

Utilizar con precaución en Doberman pinschers, Rottweillers y en animales con cristaluria o urolitos.

Usar con cuidado en animales con daño hepático.

Vía de administración: Uso Oral

Presentación: Frasco x 60 mL

**PRODUCTO**

Trimetoprima Sulfa

N° DE REGISTRO

MV-1361

CÓDIGO DE BARRAS

2. ANTIBIÓTICOS Y ANTIMICROBIANOS

TRIMETOPRIMA SULFA TABLETAS

Descripción:

Antibiótico en tabletas.

Fórmula:

Cada tableta ranurada contiene:

Trimetoprima 80 mg

Sulfametoxazol 400 mg

Indicaciones:

Infecciones de vías respiratorias, tracto urinario, gastrointestinal, piel y enteritis por coccidias.

Administración / Dosis:

Perros y gatos: 25 mg por kg (1 tableta por 16 kg de peso) cada 12 horas por 5 días o la que el Médico Veterinario indique.

Contraindicaciones:

No utilizar en pacientes con hipersensibilidad conocida a la fórmula.

Precauciones y Advertencias:

Utilizar con precaución en Doberman pinschers, Rottweillers y en animales con cristaluria o urolitos. Usar con cuidado en animales con daño hepático.

Vía de administración: Uso Oral

Presentación: Caja x 10 tabletas ranuradas

**PRODUCTO**

Trimetoprima Sulfa
Tabletas

N° DE REGISTRO

MV-1132

CÓDIGO DE BARRAS

3. ANTIPARASITARIOS INTERNOS

OVISTOP® TABLETAS 2 KG

Descripción:

Desparasitante de amplio espectro.

Fórmula:

Cada tableta ranurada contiene:

Praziquantel 15 mg

Mebendazol..... 40 mg

Pamoato de pirantel..... 40 mg

Indicaciones:

Desparasitante de amplio espectro contra los helmintos comunes en perros y gatos. Por no ser embriotóxico, teratogénico, ni mutagénico, puede ser administrado a hembras tanto gestantes como lactantes.

Su espectro incluye: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia sp.* y *Mesocestoides sp.*

Administración / Dosis:

Perros y gatos: 1 tableta por cada 2 kg de peso corporal. Se recomienda repetir la dosis a los 15 días. En animales altamente parasitados es conveniente administrar el desparasitante por 3 días consecutivos.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Precauciones y Advertencias:

Suministrar a partir de los 22 días de edad.

Vía de administración: Uso Oral**Presentación:**

Caja x 45 blíster

x 2 tabletas ranuradas

**PRODUCTO**

Ovistop® Tablet 2 kg

N° DE REGISTRO

MV-2321

CÓDIGO DE BARRAS

3. ANTIPARASITARIOS INTERNOS

OVISTOP® TABLETAS 5 KG

Descripción:

Desparasitante de amplio espectro

Fórmula:

Cada tableta ranurada contiene:

Praziquantel 37.5 mg

Mebendazol..... 100 mg

Pamoato de pirantel..... 100 mg

Indicaciones:

Desparasitante de amplio espectro contra los helmintos comunes en perros y gatos. Por no ser embriotóxico, teratogénico, ni mutagénico, puede ser administrado a hembras tanto gestantes como lactantes.

Su espectro incluye: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia sp.* y *Mesocestoides sp.*

Administración / Dosis:

Perros y gatos: 1 tableta por cada 5 kg de peso corporal. Se recomienda repetir la dosis a los 15 días. En animales altamente parasitados es conveniente administrar el desparasitante por 3 días consecutivos.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Precauciones y Advertencias:

Suministrar a partir de los 22 días de edad.

Vía de administración: Uso Oral**Presentación:**

Caja x 40 blíster

x 2 tabletas ranuradas

**PRODUCTO**

Ovistop® Tabletas 5 kg

N° DE REGISTRO

MV-2322

CÓDIGO DE BARRAS

3. ANTIPARASITARIOS INTERNOS

OVISTOP® TABLETAS 15 KG

Descripción:

Desparasitante de amplio espectro

Fórmula:

Cada tableta contiene:

Praziquantel..... 111.95 mg

Mebendazol..... 298.73 mg

Pamoato de pirantel..... 298.73 mg

Indicaciones:

Desparasitante de amplio espectro contra los helmintos comunes en perros y gatos. Por no ser embriotóxico, teratogénico, ni mutagénico, puede ser administrado a hembras tanto gestantes como lactantes.

Su espectro incluye: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia sp.* y *Mesocestoides sp.*

Administración / Dosis:

Perros y gatos: 1 tableta por cada 15 kg de peso corporal. Se recomienda repetir la dosis a los 15 días. En animales altamente parasitados es conveniente administrar el desparasitante por 3 días consecutivos.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Precauciones y Advertencias:

Suministrar a partir de los 22 días de edad.

Vía de administración: Uso Oral**Presentación:**

Caja x 30 blíster
x 2 tabletas

**PRODUCTO**

Ovistop® Tabletás 15 kg

N° DE REGISTRO

MV-2310

CÓDIGO DE BARRAS

3. ANTIPARASITARIOS INTERNOS

OVISTOP® TABLETAS 40 KG

Descripción:

Desparasitante de amplio espectro

Fórmula:

Cada tableta ranurada contiene:

Praziquantel..... 300 mg

Mebendazol..... 803.31 mg

Pamoato de pirantel..... 803.31 mg

Indicaciones:

Desparasitante de amplio espectro contra los helmintos comunes en perros y gatos. Por no ser embriotóxico, teratogénico, ni mutagénico, puede ser administrado a hembras tanto gestantes como lactantes.

Su espectro incluye: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia sp.* y *Mesocestoides sp.*

Administración / Dosis:

Perros y gatos: 1 tableta por cada 40 kg de peso corporal. Se recomienda repetir la dosis a los 15 días. En animales altamente parasitados es conveniente administrar el desparasitante por 3 días consecutivos.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Precauciones y Advertencias:

Suministrar a partir de los 22 días de edad.

Vía de administración: Uso Oral

Presentación:

Caja x 12 blíster

x 2 tabletas ranuradas

**PRODUCTO**

Ovistop® Tabletass 40 kg

N° DE REGISTRO

MV-2310

CÓDIGO DE BARRAS

3. ANTIPARASITARIOS INTERNOS

OVISTOP® SUSPENSIÓN

Descripción:

Antiparasitante de amplio espectro en suspensión oral

Fórmula:

Cada 1 mL contiene:

Praziquantel..... 7.5 mg

Mebendazol..... 20 mg

Pamoato de Pirantel..... 20 mg

Indicaciones:

Desparasitante de amplio espectro contra los helmintos comunes en perros y gatos. Por no ser embriotóxico, teratogénico, ni mutagénico, puede ser administrado a hembras tanto gestantes como lactantes.

Su espectro incluye: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia sp.* y *Mesocestoides sp.*

Administración / Dosis:

Perros y gatos: Administrar por vía oral 1 mL por kg de peso. Se recomienda repetir la dosis a los 15 días. En animales altamente parasitados es conveniente administrar el desparasitante por 3 días consecutivos.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Precauciones y Advertencias:

Suministrar a partir de los 22 días de edad.

Vía de administración: Uso Oral

Presentación: Frasco x 15 mL



PRODUCTO

Ovistop® Suspensión

N° DE REGISTRO

MV-2299

CÓDIGO DE BARRAS



4. ANALGÉSICOS, ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIALÉRGICOS

FENILBUTAZONA

Descripción:

Ungüento - Analgésico - Antiinflamatorio

Fórmula:

Cada 100 gramos contienen:

Fenilbutazona..... 3 g

Salicilato de Metilo..... 10 g

Indicaciones:

La Fenilbutazona es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) derivado de las pirazolonas. Por su acción analgésica y antiinflamatoria es recomendado para el alivio de lesiones a nivel muscular o articular, ocasionadas por golpes, torceduras u otro tipo de trauma.

Administración / Dosis:

Perros: Aplicar sobre la superficie afectada 3 veces al día hasta que desaparezca la inflamación.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a las pirazolonas y salicilatos.
No utilizar en gatos.

Precauciones y advertencias:

No aplicar en heridas o úlceras cutáneas.

Vía de administración: Uso Tópico

Presentación: Tubo x 90 g

**PRODUCTO**

Fenilbutazona

N° DE REGISTRO

MV-2682

CÓDIGO DE BARRAS

4. ANALGÉSICOS, ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIALÉRGICOS

PREDNISOLONA

Descripción:

Antiinflamatorio - Antialérgico en solución oral.

Fórmula:

Cada 5 mL contiene:

Prednisolona..... 15 mg

Indicaciones:

- Procesos inflamatorios con o sin componente inmunológico en perros y gatos.
- Para el control eficaz de los procesos alérgicos ya sean estos generales o locales, por lo que está especialmente indicada en la dermatitis alérgica por pulgas, prurito y eczema.
- Para el tratamiento de algunos desórdenes musculoesqueléticos como la artritis traumática, miositis, bursitis, tendinitis, osteoartritis y enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea canina.
- Se indica además en alergias del aparato respiratorio como bronquitis y laringitis. Enfermedades autoinmunes como anemia autoinmune y pénfigo en sus distintas presentaciones.

Administración / Dosis:

Perros y gatos:

Dermatitis alérgicas y atópicas: iniciar con 0.5 a 1 mg por kg (0.15 - 0.3 mL por kg) 2 veces al día por 5 - 8 días y luego disminuir hasta alcanzar la mínima dosis efectiva en días alternos. La dosis puede variar de acuerdo al padecimiento y criterio del Médico veterinario.

Contraindicaciones:

No usar en hembras gestantes.

Precauciones y advertencias:

Tener cuidado con su administración por falsa vía (bronco aspiración).

No suspender el tratamiento bruscamente, ir reduciendo la dosis paulatinamente.

Vía de administración: Uso oral

Presentación: Frasco x 30 mL



PRODUCTO
Prednisolona

N° DE REGISTRO
MV-4492

CÓDIGO DE BARRAS
 7 62287 82132 6

4. ANALGÉSICOS, ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIALÉRGICOS

TRAMADOL

Descripción:

Analgésico en solución oral.

Fórmula:

Cada mL contiene:

Tramadol Clorhidrato..... 100 mg

Tramadol es un analgésico de acción central con alta afinidad por los receptores μ . Provee un alivio del dolor comparable con los péptidos opiodes. La analgesia del Tramadol puede favorecerse con la combinación de AINES.

Indicaciones:

Para el manejo del dolor de moderado a severo, de origen agudo o crónico.

MANEJO DEL DOLOR		
POSOPERATORIO	OTROS	CÁNCER
Castración	Traumatismos	Tratamiento paliativo del dolor en enfermedades neoplásicas
Cirugía abdominal	Esfuerzos articulares	
Cirugía ortopédica	Procesos osteoartíticos en combinación con AINES	
Odontología	Fracturas	
Amputaciones	Cólicos	

Administración / Dosis:

Perros y gatos: Administrar de 2-5 mg por kilo de peso cada 6-8 horas o según indicación del médico veterinario. Cada mL = 20 gotas, cada gota = 5 mg.

Contraindicaciones:

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida al Tramadol.

Precauciones y advertencias:

No se recomienda su uso durante el periodo de gestación y lactancia, ni en animales débiles o epilépticos.

Vía de administración: Uso oral

Presentación: Frasco x 10 mL



PRODUCTO
Tramadol

N° DE REGISTRO
MV-5126

CÓDIGO DE BARRAS
 62287 80379 117

5. ANSIOLÍTICO NATURAL

QUIETTUSPET®

Descripción:

Tranquilizante Natural (Coadyuvante) en tabletas.

Ingredientes:

Cada tableta ranurada contiene:

Extracto seco estandarizado de Tilo (*Justicia Pectoralis*).

Indicaciones:

Contribuye al control de estados de ansiedad, nerviosismo, excitación e hiperactividad causados por: bombetas, música, truenos, grooming, separación de sus dueños, visitas al veterinario, cambio de ambiente.

Administración / Dosis:

Perros: la siguiente tabla indica una dosis de inicio la cual puede ajustarse, ya que el producto posee gran margen de seguridad. Perros de raza pequeña podrían requerir más dosis que los de raza grande. Se debe administrar mínimo una hora antes del evento desencadenante.

PESO/KG	#TABLETAS	
1 - 5	1/2	Cada 12 horas
6 - 10	1	
11 - 15	2	
16 - 50	2 - 3	

Para mejores resultados en periodos de mucho estrés, iniciar con la medicación 2 semanas antes de los eventos.

Contraindicaciones: No administrar durante la preñez.

Precauciones y advertencias:

En mascotas de presión baja, problemas cardíacos y uso de anticoagulantes, por su efecto hipotensor.

Animales geriátricos de más de 20 kg, iniciar con 1 tableta y aumentar paulatinamente la dosis.

En perros muy hiperactivos y nerviosos podría ser necesario duplicar la cantidad.

Vía de administración:

Uso oral

Presentación:

Caja x 15 blíster

x 4 tabletas ranuradas



PRODUCTO

Quiettuspet®

N° DE REGISTRO

MV-5165

CÓDIGO DE BARRAS



6. CICATRIZANTE NATURAL

CICATRIZANTE NATURAL ACEITE ÁRBOL DE TÉ + ALOE VERA

Descripción:

Cicatrizante con ingredientes naturales en emulgel.

Fórmula:

Cada 100 gramos contiene:

Aceite de Árbol de Té (*Melaleuca alternifolia*) 4 g

Extracto de Sábila (*Aloe vera*) 5 g

Indicaciones:

Coadyuvante en procesos de cicatrización de heridas y dermatitis tales como:

CICATRIZACIÓN DE HERIDAS	DERMATITIS
Dehiscencia	Pioderma de los pliegues
Segunda intención	Pioderma interdigital
Úlceras	Pioderma de los callos
Post-quirúrgica	Hot spot
Neoplasias	<i>Malassezia pachydermatis</i>
Quemaduras	Ácaros (Demodex) Por picadura de mosca en puntas de las orejas (cicatrizo y repele)

- También su efecto emoliente lo hace muy útil para uso diario en perros con problemas de callos de recumbencia.
- Fórmula transparente y de fácil absorción. No deja costra, lo que facilita la limpieza y exploración de las lesiones.

Administración / Dosis:

Perros y gatos: Aplicar 3 veces al día hasta completa recuperación.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

Precauciones y advertencias: Evitar el contacto con los ojos

Vía de administración:

Uso tópico

Presentación:

Tubo x 35 g



PRODUCTO

Cicatrizante Natural
Árbol de Té + Aloe Vera

N° DE REGISTRO

AV-5494

CÓDIGO DE BARRAS



7. GASTROENTEROLÓGICOS

LOPE LISAN®

Descripción:

Combinación antidiarreica de antibacterianos, protectores de la mucosa y Loperamida en suspensión oral.

Fórmula: Cada 100 mL contienen:

Trimetoprima	0,25 g
Sulfametoxazol	1,25 g
Caolín	7,5 g
Pectina	0,6 g
Sulfato de Neomicina	0,25 g
Loperamida HCl	0,0045 g

Indicaciones:

Tratamiento de diarreas agudas de etiología bacteriana, dietética o inflamatoria.

Administración / Dosis:

Perros y gatos: 1 - 2 mL por kg cada 12 horas por 4 días mínimo.

Contraindicaciones:

No utilizar en animales con afección hepática y/o renal, ni en pacientes sensibles a componentes de la fórmula (las razas Rottweiler y Doberman pinscher son muy sensibles a la Trimetoprima – Sulfa).

Precauciones y advertencias:

Utilizar con precaución en diarreas virales y en hembras gestantes. Hidratar adecuadamente. Si la diarrea persiste por más de 5 días o se presenta fiebre, considerar otras etiologías.

Vía de administración: Uso oral

Presentación: Frasco x 100 mL



PRODUCTO

Lope Lisan®

N° DE REGISTRO

MV-2173

CÓDIGO DE BARRAS



7. GASTROENTEROLÓGICOS

METOCLOPRAMIDA

Descripción:

Regulador de la motilidad gastrointestinal en solución oral.

Fórmula:

Cada mL contiene:

Metoclopramida base (en forma de Clorhidrato)..... 4.6 mg

Indicaciones:

La Metoclopramida aumenta el tono y la amplitud de las contracciones gástricas, relaja el esfínter pilórico e incrementa la peristalsis duodenal y yeyunal. También aumenta la presión del esfínter esofágico inferior por lo que reduce el reflujo gastroesofágico.

Se recomienda en general como regulador de la motilidad gastrointestinal superior, promoviendo el vaciamiento gástrico, lo cual favorece el control del vómito, el meteorismo y las náuseas.

Administración / Dosis:

Perros y gatos: 2 gotas por kg, 3 veces al día durante 3 a 5 días o según criterio del Médico Veterinario. En animales que requieran ser transportados se recomienda suministrar el medicamento 4 a 8 horas antes.

Contraindicaciones:

Hemorragia del tracto digestivo, perforación gastrointestinal, obstrucción del tracto digestivo e hipersensibilidad al fármaco.

Vía de administración: Uso oral

Presentación: Frasco x 30 mL

**PRODUCTO**

Metoclopramida

N° DE REGISTRO

MV-1095

CÓDIGO DE BARRAS

7. GASTROENTEROLÓGICOS

RANITIDINA

Descripción:

Antiulceroso, regulador de la acidez gástrica en solución oral.

Fórmula:

Cada 5 mL (1 cucharadita) contiene:

Ranitidina (en forma de clorhidrato)..... 150 mg

Indicaciones:

- Tratamiento y/o profilaxis de úlceras gástricas, duodenales, gastritis urémica, gastritis erosiva.
- En la prevención de la aparición de úlceras por estrés.
- Para evitar la reaparición de hemorragias digestivas.
- Para combatir y regular el síndrome paraneoplásico producido por mastocitoma.
- En el tratamiento del síndrome de reflujo gastroesofágico.

Administración / Dosis:

Perros y gatos: de 2.2 a 4.2 mg por kg de peso cada 12 horas equivalentes a una dosis de 0.1 mL por kg de peso 2 veces al día durante 4 días. El protocolo de tratamiento puede variar según criterio del Médico Veterinario.

PESO/KG	ML	Cada 12 horas
1	0,1	
5	0,5	
10	1	
20	2	

Contraindicaciones:

Animales hipersensibles a la fórmula.

Precauciones y advertencias:

En pacientes con enfermedad renal debe ajustarse la dosis.

Solo debe ser usada durante la preñez si es estrictamente necesario.

Tener cuidado con su administración por falsa vía (broncoaspiración).

Vía de administración: Uso oral

Presentación: Frasco x 60 mL



PRODUCTO

Ranitidina

N° DE REGISTRO

MV-4490

CÓDIGO DE BARRAS



8. MINERALES Y VITAMINAS

CALCIO CON FÓSFORO Y VITAMINAS B12 Y D3

Descripción:

Suplemento nutricional con minerales y vitaminas en suspensión oral.

Fórmula:

Fósforo (min).....	3.78 %
Calcio (máx).....	42.105 %
Calcio (min)	38.095 %
Vitamina B ₁₂ (min)	25 mg / kg
Vitamina D ₃ (min)	4.000.000 UI / kg
Vehículo c.s.p.	100%

Ingredientes: Vitamina B₁₂, Sacarina Sódica, Propilparabeno, Vitamina D₃, Metilparabeno, Dimetilpolixiloxano, Dióxido de Silicio Coloidal, Saborizante Vainilla, Hidroxietilcelulosa, Alcohol, Fosfato Tricálcico, Propilenglicol, Sacarosa, Carbonato de Calcio, Agua Purificada como vehículo.

Indicaciones:

Perros y gatos: Es un suplemento nutricional indicado para aportar Calcio, Fósforo, Vitaminas B₁₂ y D₃. También como coadyuvante en estados carenciales de estos nutrientes durante la fase de crecimiento, principalmente en perros de talla grande y en animales con problemas de raquitismo, osteoporosis y otros desbalances nutricionales asociados a los niveles de calcio y fósforo.

Administración / Dosis:

Perros y gatos: Suministrar diariamente de acuerdo con la siguiente indicación: **Perros** talla pequeña 2.5 - 5 mL, perros talla grande 10 - 15 mL, **gatos** 5 mL por 7 días.

En **hembras lactantes** mantener la suplementación por 2 - 3 semanas según recomendación del especialista.

Se puede dar directamente o mezclado con el alimento.

Precauciones y advertencias:

Este producto carece de toxicidad, tanto para humanos como para animales.

Agitar antes de usar.

Vía de administración: Uso oral

Presentación: Frasco x 173 mL



PRODUCTO

Calcio con Fósforo y Vitaminas B₁₂ y D₃

N° DE REGISTRO

Lic. DAA-MAG:449-001

CÓDIGO DE BARRAS



9. RESPIRATORIO

BROMHEXINA

Descripción:

Mucolítico y expectorante bronquial en solución oral.

Fórmula:

Cada 5 mL (1 cucharadita) contiene:
Bromhexina HCl..... 4 mg

Indicaciones:

La Bromhexina es un agente mucolítico utilizado en el tratamiento de trastornos respiratorios asociados con mucosidad viscosa o excesiva.

Debido a su acción expectorante está recomendado como coadyuvante en el tratamiento de trastornos respiratorios en perros y gatos.

Administración / Dosis:

Perros y gatos: 5 mL (1 cucharadita) por cada 4 kg de peso, dos veces al día por 5 a 7 días. Se observa respuesta a partir de 48 horas de iniciado el tratamiento.

Precauciones y advertencias:

Suministrar con precaución en animales con gastritis o úlcera gástrica.

Vía de administración: Uso oral

Presentación: Frasco x 60 mL y 120 mL

**PRODUCTO**

Bromhexina

N° DE REGISTRO

MV-1159

CÓDIGO DE BARRAS

10. SHAMPOO MEDICADO

SHAMPOO GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 3%

Descripción:

Antiséptico y antibacteriano

Fórmula:

Cada 100 mL contiene:

Gluconato de Clorhexidina 3%

Indicaciones:

La Clorhexidina es un antiséptico con actividad bactericida. Actúa dañando las membranas citoplasmáticas bacterianas y posee función antifúngica a una concentración mayor al 2%. Por ello, es eficaz en la profilaxis y tratamiento de dermatitis y piodermas.

Posee acción contra *Staphylococcus intermedius*, *Malassezia pachydermatis* y *Mycrosporium canis*.

Su fórmula libre de **sulfatos y parabenos** evita que se reseque la piel y favorece su hidratación.

Administración / Dosis:

Perros y gatos

Preventivo:

Humedezca el pelo de la mascota, aplicar cantidad suficiente de shampoo dejándolo por 2 minutos y retirar con suficiente agua. Repetir cada 2 - 4 semanas o según se requiera.

Tratamiento:

Previamente humedezca la mascota, aplicar el shampoo y dejar en contacto con el pelo y la piel durante 8 minutos y enjuagar. Repetir el tratamiento cada 3 días hasta la desaparición de las lesiones. En lesiones localizadas se puede aplicar el shampoo directamente sobre la zona afectada.

Vía de administración: Uso Tópico

Presentación: Frasco x 220 mL, litro y galón



PRODUCTO

Shampoo Gluconato de clorhexidina 3%

N° DE REGISTRO

MV-1892

CÓDIGO DE BARRAS



II. SHAMPOO COSMÉTICO

SHAMPOO CON ALOE VERA

Descripción:

Shampoo Aloe Vera (Sábila) 100% Natural
Revitalizador de la piel y abrillantador del pelo.

Fórmula:

Cada 100 mL contiene:

Aloe vera (*Aloe barbadensis Miller*) 5 %

Indicaciones:

Por sus propiedades emolientes, humecta e impide la resequedad y el agrietamiento de la piel.

También posee un efecto astringente, regenerante y renovador permitiendo una limpieza profunda.

Administración / Dosis:

Perros y gatos:

- Humedecer el pelo de su mascota, aplicar frotando una cantidad suficiente del shampoo, dejar actuar por 5 - 10 minutos y enjuagar.
- Repetir cada 2 - 4 semanas o según indicación médica.

Vía de administración: Uso Tópico

Presentación: Frasco x 245 mL



PRODUCTO

Shampoo Aloe vera

N° DE REGISTRO

AV-1738

CÓDIGO DE BARRAS



11. SHAMPOO COSMÉTICO

SHAMPOO DE ARCILLA Y AZUFRE

Descripción:

Coadyuvante en el control de ácaros, hongos y bacterias

Fórmula:

Cada 100 mL contiene:

Azufre..... 1.5 g

Arcilla volcánica..... 2 g

Indicaciones:

Por su contenido de azufre sublimado, es efectivo en la profilaxis y tratamiento de ciertas patologías cutáneas producidas por ácaros, hongos y bacterias.

La arcilla volcánica absorbe todo tipo de impurezas de la piel y el pelo, produciendo una excelente limpieza.

Administración / Dosis:

Perros y gatos:

Preventivo:

Humedezca el pelo de la mascota, aplicar cantidad suficiente de shampoo dejándolo por 1 - 2 minutos y retirar con suficiente agua. Repetir cada 2 - 4 semanas o según indicación del Médico Veterinario.

Tratamiento:

Se aplica al pelo previamente humedecido por 5 minutos y retirar con suficiente agua; repetir 1 a 2 veces por semana o según indicación del Médico Veterinario.

Vía de administración: Uso Tópico

Presentación: Frasco x 245 mL



PRODUCTO

Shampoo de
Azufre y Arcilla

N° DE REGISTRO

AV-1739

CÓDIGO DE BARRAS



7 822877 5005 3

11. SHAMPOO COSMÉTICO

SHAMPOO CON AZUL DE METILENO

Descripción:

Abrillantador y estabilizador de la pigmentación del pelo blanco o negro

Fórmula:

Cada 100 mL contiene:

Azul de metileno..... 0.001%

Indicaciones:

Posee acción antiséptica y es un eficaz abrillantador y estabilizador de la pigmentación del pelo, lo que favorece su recuperación.

Ideal para razas de pelo blanco ya que elimina las manchas amarillentas.

En perros de pelaje negro mejora radicalmente su estado, proporcionando un brillo intenso.

Administración / Dosis:**Perros y gatos**

- Humedecer el pelo de la mascota, aplicar una cantidad suficiente de shampoo dejándolo por 5 minutos y retirar con suficiente agua.
- Repetir cada 2 - 4 semanas o según se requiera.

Vía de administración: Uso Tópico

Presentación: Frasco x 245 mL

**PRODUCTO**

Shampoo con
Azul de Metileno

N° DE REGISTRO

AV-1891

CÓDIGO DE BARRAS

12. ANTISÉPTICOS

STEROVET® 4%

Descripción:

Antiséptico - Desinfectante

Solución antimicrobiana para uso tópico y desinfección de materiales y superficies.

Fórmula:

Cada 100 mL contiene:

Clorhexidina Gluconato..... 4 g

Excipientes c.s.p. 100 mL

Indicaciones:

Solución tópica para uso en bovinos, equinos, suinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.

Desinfectante y antiséptico concentrado a base de Gluconato de Clorhexidina con gran poder bactericida, fungicida y virucida. Su amplio espectro de acción permite una eliminación microbiana de alto nivel, tanto en la piel como superficies.

Indicado para uso intrahospitalario, ya que permite diversas aplicaciones.

También en la antisepsia de actividades clínicas y quirúrgicas para pequeñas y grandes especies.

Recomendaciones de uso:

Diluir Sterovet 4% con agua purificada o agua destilada para elaborar 100 mL de solución.

Solución sin diluir 4%:

- Lavado de manos quirúrgico.
- Desinfección de la piel del paciente antes y después del procedimiento quirúrgico.
- En la preparación para toma de vías centrales, colocación de catéter, venopunción, etc.
- Desinfección de instrumental quirúrgico, utensilios odontológicos, equipo médico y superficies.

Solución al 2%: (agregar 50 mL de Sterovet 4% en 50 mL de agua):

- Lavado clínico de de manos, luego de una exposición a fluidos corporales o después de retirarse los guantes tras el contacto con agentes infecciosos.

Solución al 0.4% (agregar 10 mL de Sterovet 4% en 90 mL de agua):

- Limpieza de heridas superficiales como quemaduras, erosiones, mordeduras y otras lesiones cutáneas.

Solución al 0.08% (agregar 2 mL de Sterovet 4% en 98 mL de agua):

- Limpieza y desinfección de heridas profundas con gran pérdida de tejido, fracturas expuestas, irrigaciones quirúrgicas, entre otras.

Advertencias y precauciones:

Hipersensibilidad y las reacciones locales posibles.

La probabilidad de irrigación se incrementa a medida que se aumenta la concentración.

Se recomienda utilizar soluciones recién preparadas y descartar el sobrante.

Contraindicaciones: No utilizar en ojos ni oídos.

Vía de administración: Uso tópico y superficies.

Presentación: Frasco x 1 litro



PRODUCTO

Sterovet® 4%

N° DE REGISTRO

MV-5460

CÓDIGO DE BARRAS





TRABAJAMOS
POR EL
BIENESTAR
de mascotas
y animales



En Lisan
producimos
medicamentos
para especies
menores y mayores,
que cumplen con
los más altos
estándares de
calidad



EFICACIA
+
RESPALDO
+
TRAYECTORIA



 **Lisan**®
calidad humana para sus mascotas

Dirección física:

Zona Industrial de Curridabat
500 metros oeste de Café Volio
Curridabat, San José
Costa Rica 11801

Dirección Postal:

Apartado Postal 91-2300
Curridabat, San José
Costa Rica 11801

Información de contacto:



+506 2259-9797



veterinaria@lisanr.com



Laboratorios Lisan



www.lisanr.com



Lisan  [®]
excelencia en medicamentos

Lisanatura  [®]
el poder de la naturaleza

 **Lisan**  [®]
calidad humana para sus mascotas